

### PREPORUKE VINOGRADARIMA KONTINENTALNE REGIJE



**Petar Živković**

petar.zivkovic@bayer.com  
+385 98 256 924

Na ranim sortama grožđa cvatnja je počela. Od kretanja vegetacije do cvatnje prošlo je oko 40 dana što je najkraće vrijeme koje pamtim.

Preporuka je prije cvatnje Mikal® Premium 3 kg/ha + Luna® Experience 0,375 l/ha. Bez obzira na početak cvatnje vinograd se mora zaštititi od bolesti.

Kada vinograd cvate ne treba ništa raditi dok ne završi cvatnja. Mikal® Premium i Luna® Experience su dugotrajni fungicidi pa nije potrebno špricati vinograde dok ne ocvatu. Dodavanje folijarne gnojide ne preporučujem u neposredno pred cvatnju ili u cvatnji jer npr. bor može spaliti cvat.

Kada završi cvatnja može se obavljati zelena rezidba (štucanje). Insekticide koristite nakon cvatnje jer su u cvatnji opasni za pčele i cvat loze.



Početak cvatnje



Uredan vinograd pred cvatnju

Podregija/vinogorje	Fenofaza: 30.05.2022.	Opasnost od bolesti/štetnika	Preporuka za tretiranje	Doza	Kontakt osoba i broj mob.
Slavonija i Podunavlje	Pred cvatnju	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Petar Živković, 098 256-924
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	
Bregovita Hrvatska	Pred cvatnju	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Petar Živković, 098 256-924
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	

**Napomena:** Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati na siguran način. Pri odabiru sredstva poštivati priložene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije

### PREPORUKE ZA JUŽNU, SREDNJU, SJEVERNU DALMACIJU, HRV. PRIMORJE I ISTRU



**Dean Crnošija**

dean.crnosija@bayer.com  
+385 98 419 229

Sušno vrijeme koje obilježava ovogodišnju vegetaciju je krajem proteklog tjedna prekinuto s oborinama, uzduž obalnog pojasa, negdje i obilnijim. Na nekim položajima su padale i vrlo obilne kiše koje su došle u vrlo osjetljivoj fenofazi razvoja vinove loze. U većini vinograda primorskog pojasa loza je u fazi cvatnje ili precvjetavanja, pa možemo zaključiti da je sa stanovišta kvalitetne oplodnje ovakvo vrijeme i nije povoljno, posebice što se tiče moguće zaraze plamenjačom cvata ili tek oplodjenih cvatova. To vinogradaru mora ukazati na posebnu pozornost u planiranju ovojedne zaštite vinograda od napada bolesti vinove loze. Za nadati se da vremenska prognoza koja najavljuje stabilnije vrijeme ovog tjedna bude točna, i da vinova loza nakon oplodnje ima normalne uvjete za razvoj tek oplodjenih grozdova.

Ovdje opet s gledišta tehnološkog zahvata zaštite vinograda od bolesti i štetnika treba biti posebno oprezan. Vlaga u ovoj osjetljivoj fazi razvoja loze predstavlja dodatnu opasnost. Stoga je preporuka obaviti redovitu zaštitu za one proizvođače kojima je protelo desetak dana od posljednje, uz posebnu pozornost na odabir sredstava.

Sada i u naredna dva tretmana odabir mora biti najkvalitetniji sistemski pripravak za sve bolesti vinove loze koje sada imaju optimalne uvjete za razvoj, posebice što je loza u najkritičnijoj fazi razvoja u odnosu na pojavu i širenje bolesti. Kod loze pri kraju cvatnje, je trenutak kada u plan zaštite moramo obvezno uvrstiti i jedan proizvod iz grupe botricida, odnosno sredstva koje djeluju na sivu plijesan. Upravo je sada trenutak za prvi od tri obvezna tretmana. Botritis je u tzv. „spavajućoj“ fazi, hrani se mrtvom organskom tvari (ostacima cvijetova) i ukoliko ne reagiramo u smislu zaštite, gljiva botritisa ostaje u formiranom grozdiću i čeka povoljni trenutak za stvaranje štete u kasnijoj fazi razvoja grožđa.

Ovaj tjedan za suzbijanje bolesti preporučujemo kombinaciju tri visoko učinkovita pripravka iz palete Bayerovog programa zaštite u vinovoj lozi.

1. Mikal® Premium F s tri djelatne tvari koje osiguravaju kontaktnu, sistemsku, preventivnu i kurativnu zaštitu od plamenjače.
2. Teldor® kao najsigurniji pripravak u zaštiti od sive plijesni
3. Luna® Experience koji s dvije djelatne tvari u svom sastavu omogućava sigurnu zaštitu od pepelnice i u uvjetima najvećeg pritiska bolesti koje u ovim agroekološkim uvjetima sigurno možemo očekivati.

Počela je migracija štitastih ušiju (*Pseudococcus spp.*, *Lecanium corni*), kao informacija za vinogadare koji imaju problema s ovim tvrdokornim štetnikom. Upravo je migracija pokretnog stadija ovog štetnika idealni trenutak za kvalitetno suzbijanje. Za tu namjenu tvrtka Bayer raspolaze s pripravkom Movento® 100 SC.



Sporulacija sekundarne infekcije plamenjače



štitaste uši - loza

Podregija/vinogorje	Fenofaza: 30.05.2022.	Opasnost od bolesti/štetnika	Preporuka za tretiranje	Doza	Kontakt osoba i broj mob.
Hrvatska Istra -ranije sorte	Kraj cvatnje	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	
		Siva plijesan	Teldor	1,5 l/ha	
Hrvatska Istra -kasnije sorte	Cvatnja	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	
		Siva plijesan	Teldor	1,5 l/ha	
Hrvatsko Primorje	Cvatnja	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	
		Siva plijesan	Teldor	1,5 l/ha	
Sjeverna Dalmacija	Cvatnja	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	
		Siva plijesan	Teldor	1,5 l/ha	
Dalmatinska Zagora	Cvatnja	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	
		Siva plijesan	Teldor	1,5 l/ha	
Vinogorje Imotski	Cvatnja	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	
		Siva plijesan	Teldor	1,5 l/ha	
vinogorje Vrgorac	Kraj cvatnje	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	
		Siva plijesan	Teldor	1,5 l/ha	
Srednja i Južna Dalmacija	Cvatnja Porast bobica (ranije sorte, topliji položaji)	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	
		Siva plijesan	Teldor	1,5 l/ha	
Vinogorje Konavosko	Cvatnja	Plamenjača	Mikal Premium	3 kg/ha	Dean Crnošija, 098 419-229
		Pepelnica	Luna Experience	0,375 l/ha	
		Siva plijesan	Teldor	1,5 l/ha	

**Napomena:** Sredstva za zaštitu bilja primjenjivati na siguran način. Pri odabiru sredstva poštivati priložene upute o vremenu primjene i broju tretmana tijekom vegetacije