



No. 8

Bayer  
Voćarski  
Dnevnik

## Budite prvi!

Saznajte najnovije informacije naših stručnjaka izravno s terena!

### OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA JABUKE!

U nasadima jabuke u kojima je prisutna kalifornijska štitasta uš (poznata i kao San Jose) uočena je pojava prvih pokretnih stadija - ličinki ili „šetača“.

Ličinke ili „šetači“ svijetlo žute su boje, veličine vrha igle i najosjetljiviji su na insekticide. Voćare upozoravamo da u narednim danima obave prvo tretiranje insekticidom Movento®.



Movento® treba primijeniti u dozi 2 L/ha uz obavezan dodatak okvašivača koji pospešuje usvajanje i ubrzava njegovo djelovanje.

Također, za uspješno usvajanje insekticida Movento® potrebna je dovoljno bujna i mlada lisna masa.



Mladi izboji

Osim prvih pokretnih stadija kalifornijske štitaste uši u nasadima jabuke i dalje su prisutne populacije zelene i pepeljaste lisne uši. Primjena Moventa® suzbiti će i njihovo daljnje širenje.



Jabučna zelena lisna uš  
(*Aphis pomi*)



Pepeljasta lisna uš  
(*Dysaphis plantaginea*)



Voćarima skrećemo pažnju i na redovitu kontrolu nasada na prisutnost crvenog voćnog pauka (*Panonychus ulmi*) čija se aktivacija očekuje s porastom temperature zraka.



Ukoliko želite primati savjete vezane za zaštitu voća i vinograda prijavite se putem web stranice Bayer Agro Info servis i pratite najnovije informacije naših stručnjaka izravno s terena ili putem nove BayAgro platforme - aplikacije koja se vrlo lako može preuzeti i koristiti na svim pametnim telefonima.

