Bayer Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja kojima se proširuje primjena

Naziv sredstva	Klasa rješenja o registraciji	Aktivna tvar	Vrsta bilja i/ili uvjeti primjene	Ciljani štetni organizmi	Maximalni broj primjena	Vremenski razmak između primjena (min.u danima)	Količina primjene	Voda (L/ha)	Karenca (dana)	Vrijeme primjene	Napomena
ALIETTE FLASH	UP/I-320-20/06-01/131	*fosetil aluminij* 800 g/kg	Agrumi	gumoza (Phytophthora spp.) u nasadima	-	-	0,25%	250 g u 100 L	15	Tretirati 3 puta travanj, srpanj i rujan/listopad (početkom, u sredini i krajem vegetacije)	
ALIETTE FLASH	UP/I-320-20/06-01/131	*fosetil aluminij* 800 g/kg	Agrumi	gumoza (Phytophthora spp.) kod cijepljenja	-	ponoviti nakon 3 ili 4 tjedna	0,25-0,30%	250-300 g u 100 L vode	15	15 dana prije cijepljenja	
ALIETTE FLASH	UP/I-320-20/06-01/131	*fosetil aluminij* 800 g/kg	Agrumi	gumoza (Phytophthora spp.) u rasadnicima i mladim nasadima	-	ponavljajuće tretiranje svaka 2 mjeseca	0,30%	300 g u 100 L vode	15	-	
ALIETTE FLASH	UP/I-320-20/06-01/131	*fosetil aluminij* 800 g/kg	Agrumi	gumoza (Phytophthora spp.) kod nasada sa sustavom navodnjavanje kapanjem	najviše dvaput u vegetaciji	-	1-25 g po stablu (najviše 10 kg/ha)		15	-	
ALIETTE FLASH	UP/I-320-20/06-01/131	*fosetil aluminij* 800 g/kg	Agrumi	vlažna trulež korjenova vrata (Phytophthora citrophthora)	-	-	0,25%, u slučaju obilnije kiše 0,30%	250 g u 100 L, 300 g u 100 L vode	15	Primjena u jesen, od početka promjene boje i tijekom sazrijevanja.	
ALIETTE FLASH	UP/I-320-20/06-01/131	*fosetil aluminij* 800 g/kg	Jagoda	Phytopthora	-	-	0,25%	250g u 100L vode	7	Prvi puta primjeniti u mjesecu sadnje, a zatim svakih 25 dana	
ALIETTE FLASH	UP/I-320-20/06-01/131	*fosetil aluminij* 800 g/kg	Trava namijenjena za sportske terene i travnjake	Phytium i Phytophthora	-	-	12-24 kg/ha	-	-	-	
ALIETTE FLASH	UP/I-320-20/06-01/131	*fosetil aluminij* 800 g/kg	Čempresi	Phytophthora	-	-	10g/m²		-	Primjena u rasadnicima po tlu, pomoću kante za zalijevanje.	
ALIETTE FLASH	UP/I-320-20/06-01/131	*fosetil aluminij* 800 g/kg	Luk	Plamenjača (Peronospora destructor)	-	-	2 kg/ha (0,2%)	1000 L	7	Primjeniti 1-2 puta u vegetaciji kod prvih simptoma ili preventivno u razmacima od 10 dana.	Sredstvo se može primijeniti od početka formiranja lukovice pa do veličine 75% konačnog promjenra lukovice.