

Vinova **loza**

*Zaštitna sredstva
i programi zaštite*



NATIVO® 



Sistemični fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze.

Djelovanje

kontaktno, sistemsko, preventivno, kurativno

Aktivna tvar

tebukonazol (500 g/kg), trifloksistrobin (250 g/kg)

Formulacija

WG – močive samodispergirajuće granule

Doza primjene

vinova loza: 0,2 kg/ha

Pakiranje

20 g, 200 g, 1 kg

- // Zaštita vinove loze od pepelnice 12–14 dana.
- // Odlično kurativno djelovanje.
- // Dobro sporedno djelovanje na sivu plijesan.
- // Kratka karenca (12–14 dana).
- // Nativo® zbog dugotrajne učinkovitosti preporučujemo kombinirati s pripravcima protiv plamenjače Mikal® premium F ili Profiler®.
- // Nativo® se može miješati sa proizvodima na bazi sumpora.

Fungicid

PROSPER®



Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu.

Djelovanje

kontaktno, sistemično, preventivno, kurativno

Aktivna tvar

Spiroksamin (300 g/l)

Formulacija

CS - inkapsulirana suspenzija

Doza primjene

vinova loza: 1 l/ha

Pakiranje

1 L, 250 mL

- // Visoka efikasnost protiv pepelnice.
- // Izuzetna sistemichnost i efikasnost pri visokim teperaturama.
- // Fleksibilan u uporabi.
- // Efikasan i siguran.
- // Maksimalan broj tretmana u toku godine je 2.
- // Odlična pokrovnost i oslobađanje aktivne tvari na površini lista.
- // Za produljeno djelovanje dodati Folicur® 0,1 l/ha ili sumporni pripravak (prema preporuci proizvođača).



Serenade ASO je biološki fungicid i baktericid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, povrćarstvu i ratarstvu.

Djelovanje

biološko, kontaktno, preventivno

Aktivna tvar

Bacillus amyloliquefaciens (14,1 g/L)

Formulacija

SC - koncentrat za suspenziju

Doza primjene

vinova loza: 4 l/ha

Pakiranje

1 L

- // Biološki preparat.
- // Efikasan i siguran.
- // Suzbija sivu plijesan (*Botrytis cinerea*).
- // Sredstvo se primjenjuje preventivno, u razdoblju kada postoje povoljni uvjeti za razvoj bolesti od faze vidljivo odvojenih cvjetnih pupova do berbe.
- // Dozvoljene su najviše 4 primjene tijekom vegetacije.
- // Za optimalnu učinkovitost osigurati kvalitetnu aplikaciju i dobru pokrovnost grozdova.

Biološki proizvod

FLiPPER®



Kontaktini insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju lisnih uši, štitastih uši, grinja, štitastih moljaca i tripsa u ratarstvu, voćarstvu, povrćarstvu i hortikulturi.

Djelovanje

kontaktno

Aktivna tvar

masne kiseline kalijeve soli, 479,8 g/L

Formulacija

Emulzija, ulje u vodi (EW)

Doza primjene

vinova loza: 3-10 L/ha

Pakiranje

5 L

- // Biološki kontaktini insekticid i akaricid pogodan za primjenu u ekološkoj proizvodnji.
- // Siguran za oprašivače i ostale korisne kukce.
- // Bez karence.
- // Široka registracija na voću i povrću.
- // Idealan partner konvencionalnim insekticidima u programima integrirane zaštite.
- // Aktivna tvar prodire ispod kutikule štetnika koji se prestaje hraniti, guši se i brzo ugiba.

Fungicid

Luna[®]
EXPERIENCE



Kombinirani fungicid jedinstvenog načina djelovanja namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.

Djelovanje

sistemično, preventivno, kurativno

Aktivna tvar

fluopiram (200 g/l), tebukonazol (200 g/l)

Formulacija

SC - koncentrirana suspenzija

Doza primjene

vinova loza: 0,375 l/ha

Pakiranje

100 mL i 1 L

- // Izvanredna učinkovitost i najširi spektar djelovanja.
- // Sistemično djelovanje jamči učinkovitu zaštitu biljnih dijelova koji nisu bili neposredno tretirani.
- // Vrhunska zaštita koja dugoročno poboljšava zdravlje tretirane biljke i plodova pri skladištenju.
- // Za uspješnu pripremu pripravka za tretiranje važno je poštivati redoslijed miješanja formulacija. Naše preporuke su: 1. SL, 2. SC, KS, FL, 3. WP, 4. WG, DF, 5. SE, 6. EC, 7.EW, 8.OD, 9. Okvašivači, 10. Folijarna gnojiva.
- // Pouzdan partner Mikal[®] Premiumu za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi.

Fungicid

Mikal[®]
FLASH



Sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinovoj lozi.

Djelovanje

kontaktno, sistemsko, preventivno

Aktivna tvar

fosetil-AL (500 g/kg), folpet (250 g/kg)

Formulacija

WG – močive samodispergirajuće granule

Doza primjene

vinova loza: 3-4 kg/ha

Pakiranje

250 g, 1 kg

- // Usvaja se u biljku već 30 minuta nakon primjene i kiša ga ne može isprati.
- // Aktivna tvar je 1 sat nakon primjene aktivno raspoređena po cijeloj biljci.
- // Povećava prirodnu otpornost biljke.
- // Mikal[®] Flash primjenjujemo na zdravoj lozi. Ako smo opazili prve simptome bolesti, umjesto pripravka Mikal[®] Flash preporučujemo primjenu Mikal[®] Premium F koji posjeduje kurativno djelovanje.

Fungicid

Mikal[®]
premium F



Sistemični i kontaktni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.

Djelovanje

kontaktno, sistemsko, preventivno, kurativno

Aktivna tvar

fosetil-Al (500 g/kg), folpet (250 g/kg), iprovalikarb (40 g/kg)

Formulacija

WG – močive samodispergirajuće granule

Doza primjene

vinova loza: 3 kg/ha

Pakiranje

200 g i 1 kg

- // Fungicid s najboljim preventivnim i kurativnim djelovanjem.
- // Fungicid koji osigurava najduži razmak između dva tretiranja.
- // Povećava prirodnu otpornost biljke.
- // Zbog posebnog načina djelovanja Mikal[®] premium F se preporučuje koristiti u bloku i to od početka cvatnje, završetka cvatnje i nakon cvatnje. Razmak između tretiranja treba biti 12–14 dana.
- // U slučaju pojave simptoma plamenjače preporučujemo primjenu preparata Mikal[®] premium F zbog njegovog kurativnog djelovanja.



Kombinirani preventivni fungicid koji se koristi za suzbijanje plamenjače vinove loze.

Djelovanje

kontaktno, sistemično, preventivno

Aktivna tvar

fosetil-Al (666,7 g/kg), fluopikolid (44,4 g/kg)

Formulacija

WG – močive samodispergirajuće granule

Doza primjene

vinova loza: 2,5–3 kg/ha

Pakiranje

250 g, 1 kg

- // Iznimno dobro štiti grozdiće i listove.
- // Dugotrajno djelovanje - omogućuje razmak između tretiranja od 12–14 dana.
- // Kratka karenca.
- // Neizostavan alat u borbi protiv rezistentnosti.
- // Povećava prirodnu otpornost biljke.
- // Miješanje s pripravkom Luna® Experience nije preporučljivo.

Fungicid

TELDOR®



Specifični botriticid izvrsnog djelovanja na sivu plijesan vinove loze.

Djelovanje

kontaktno, preventivno

Aktivna tvar

fenheksamid (500 g/l)

Formulacija

SC – koncentrirana suspenzija

Doza primjene

vinova loza: 1–1,5 l/ha

Pakiranje

100 mL, 1 L

- // Efikasan i siguran.
- // Postojan i dugotrajan.
- // Registriran za veliki broj kultura.
- // Kratke karence bez štetnog utjecaja u proizvodnji vina.
- // Bez mogućnosti pojave unakrsne rezistentnosti.
- // Tretiranje pripravkom Teldor® odmah nakon cvatnje te prije zatvaranja grozdova ključno je za uspješno suzbijanje sive plijesni.
- // Za sprječavanje pojave sive plijesni dovoljno je tretiranje samo u zoni grozdova.

SIVANTO[®]
prime



Sistemični insekticid za suzbijanje američkog cvrčka u vinogradu.

Djelovanje

kontaktno, sistemsko

Aktivna tvar

flupiradifuron (200 g/l)

Formulacija

SL - koncentrat za otopinu

Doza primjene

vinova loza: 0,5 l/ha

Pakiranje

100 mL, 1 L

- // Novi standard u kontroli američkog cvrčka (vektor fitoplazme vinove loze).
- // Nova aktivna tvar flupiradifuron osigurava najviši sigurnosni standard – ekološki prihvatljiv i učinkovit protiv štetnih insekata.
- // Prilagodljivo vrijeme uporabe.
- // Pripravak nije opasan za pčele.
- // Kod suzbijanja američkog cvrčka sredstvo treba primijeniti na temelju monitoringa kod pojave ličinki L1-L2 stadija.

Insekticid

SIVANTO[®]
energy



*Kontaktno sistemski insekticid za suzbijanje
štetnika u vinogradu.*

NOVO

Djelovanje

kontaktno, sistemsko

Aktivna tvar

flupiradifuron (75 g/l),
deltametrin (10 g/l)

Formulacija

EC – tekući koncentrat za emulziju

Doza primjene

vinova loza: 0,4 L/ha

Pakiranje

10 mL, 50 mL, 1 L

- // 2 aktivne tvari s 2 različita mehanizma djelovanja – kombinacija snažnog kontaktnog i sistemskog djelovanja.
- // Neizostavan alat u borbi protiv rezistentnosti.
- // Može se kombinirati s fungicidima iz Bayerove palete proizvoda.



Cjenovno prihvatljiv insekticid za odlično suzbijanje insekata na vočkama, vinovoj lozi, žitaricama, uljanoj repici i krumpiru.

Djelovanje

kontaktno

Aktivna tvar

deltametrin (100 g/l)

Formulacija

EC - tekući koncentrat za emulziju

Doza primjene



vinova loza: 0,125–0,175 l/ha

Pakiranje

10 mL, 50 mL, 250 mL, 1 L

- // Cjenovno prihvatljiv insekticid.
- // Suzbija širok spektar insekata.
- // Iznimno brzo djelovanje.
- // Decis® 100 EC ne smije se koristiti pri visokim temperaturama (iznad 28 °C), jer je vrlo hlapljiv.
- // Pripravak je opasan za pčele! Tretiranje treba izbjegavati u vrijeme cvatnje kultiviranih biljaka i niskog raslinja. Kako bi se zaštitile pčele i ostali oprašivači tretiranje je potrebno obaviti 2 sata nakon zalaska ili 2 sata prije izlaska sunca.

Program zaštite vinove loze

									
	Bubrenje pupa	3-4 lista	Mladice 8-12 cm	Mladice 30-50 cm	Neposredno prije cvatnje	Nakon cvatnje	Rast boba	Zatvaranja grozda	Dozrijevanje
plamenjača vinove loze		kontaktni pripravci po potrebi	 3-4 kg/ha	 2,5–3 kg/ha	 3 kg/ha	 3 kg/ha	 2,5-3 kg/ha	 2,5–3 kg/ha	kontaktni pripravci po potrebi
crna pjegavost	registriran kontaktni pripravak								
pepelnica	sumporni pripravci	sumporni pripravci	 0,2 kg/ha	 1 l/ha	 0,375 l/ha	 0,375 l/ha	 1 l/ha	 0,2 kg/ha	
siva plijesan						 1-1,5 l/ha ili SERENADE ASO 4 l/ha		 1-1,5 l/ha ili SERENADE ASO 4 l/ha	 1-1,5 l/ha ili SERENADE ASO 4 l/ha
štitaste uši						 3-10 l/ha	 3-10 l/ha		
grinje	sumporni pripravci								
groždani moljci								 0,125–0,175 L/ha	
američki cvrčak						 0,5 l/ha ili FLIPPER 3-10 l/ha	 0,4 l/ha ili FLIPPER 3-10 l/ha	 0,4 l/ha ili FLIPPER 3-10 l/ha	 3-10 l/ha
biostimulatori			 2 l/ha	 2 l/ha	 2 l/ha	 2 l/ha	 2 l/ha	 1-2 l/ha	 1-2 l/ha

★ Profiler® je moguće primjeniti maksimalno 3 puta u vegetaciji. Ukoliko se u vegetaciji protiv pepelnice koristi Luna® Experience 2 puta, uporaba Profilera nije dozvoljena. Ukoliko se Luna® Experience primjeni jednom u vegetaciji moguće je primjeniti Profiler® maksimalno jedan put. Miješanje Profilera® s Lunom Experience ne preporučujemo. Teldor® je moguće primjeniti maksimalno 2 puta u vegetaciji.



www.cropscience.bayer.hr
agro.info@bayer.com

Katalog je informativnog karaktera, može sadržavati tiskarske pogreške. Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja na siguran način. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu.

Biostimulator



Biostimulator koji optimizira fiziologiju i ishranu loze te smanjuje utjecaj stresa iz okoline.

Djelovanje
hranjivi pospešivač rasta

Sadrži
aminokiseline, fulvinske kiseline, cink, mangan, bor

Formulacija
tekućina

Doza primjene
vinova loza: 2 l/ha

Pakiranje
5 L

- // Smanjuje deformiranost pupoljaka i omogućava ravnomjerno bubrenje.
- // Izdužuje peteljku kod sorti koje imaju zbijen grozd što smanjuje potencijal za razvoj botrytisa.
- // Osigurava esencijalne mikroelemente za poboljšanje cvatnje i ravnomjernije zatanje bobica.
- // Primjenom u kombinaciji sa SZB značajno poboljšava njihovu učinkovitost (posebno sa Serenade Aso i Flipperom).
- // Aktivira obrambeni mehanizam enzima protiv oksidativnog stresa.

Biostimulator



Biostimulator od ekstrakta algi koji omogućava snažniji razvoj i jači metabolizam loze.

Djelovanje
biljni biostimulator

Sadrži
ekstrakt makroalgi

Formulacija
tekućina

Doza primjene
vinova loza 1-2 l/ha

Pakiranje
5 L

- // Povećava fotosintezu i osigurava više energije za rast i razvoj (veći grozdovi).
- // Poboljšava kvalitativna svojstva poput sadržaja šećera.
- // Biološki aktivne komponente u formulaciji pomažu u stresnim uvjetima i pospešuju ishranu biljke.

Prodajni predstavnik



Dean Crnošija
+385 98 419 229 // dean.crnosija@bayer.com

Poslovni partner na terenu



Petar Živković
+385 98 256 924 // petarzivkovic2860@gmail.com

IZDAO:
Bayer d.o.o.
Radnička cesta 80
Zagreb
Siječanj 2026.
www.cropscience.bayer.hr